

当院の調剤内規について

(平成 25 年 8 月現在)

1. 約束処方

別紙 1 参照

2. 薬袋

① 同一Rp.内で服用量が違う場合

複数の錠剤(カプセルを含む、以下省略)・散剤(この場合は、あらかじめ分包された散剤または、商品で分包品を購入している散剤)が処方されていて、それらの服用量(錠数・包数)が違う時は、各々別の薬袋を使用する。

例外: 頓服薬は、同一薬袋とする。

② 各回の服用量が異なる処方の場合

➤ 各回の服用量が、錠剤の整数倍の時

1つの薬袋を使用し、それぞれの服用量を薬袋に記載する。

例: 薬品A錠 5 個 / 3 × 1N 朝 2・昼 2・夕 1

➤ 各回の服用量が、錠剤の整数倍でない時

錠剤に割線があり分割可能な場合は、1回分を1包として各回別の薬袋を使用する。

例: 薬品B錠 2.5 個 / 2 × 1N 朝 1.5・夕 1

3. ODP

① 一包化の指示ある場合

原則 1 種類でも分包する

用法または、日数が異なる場合は、別々に分包する

薬袋は、各回で 1 袋とする。

② ODP不可薬品(別紙 2 参照)

タケプロン OD 錠は、簡易懸濁法ため不可

4. 散剤

① 賦形

1包が 0.1gに満たない場合は、賦形薬を加えて1包を 0.1gにする。

原則として賦形薬には乳糖を用いる。

例外: INH、酸化マグネシウムにはバレイショデンプン用いる。

② 粉碎

粉碎の指示がある場合または、錠剤で割線の無い薬品が、0.5 錠で処方された場合は、粉碎する。

③ 分包品

分包品のある散剤が処方された時は、原則分包品を使用する。

薬袋への記載は1回〇包とする。

組合せ散剤の時は、1回各〇包とする。



5. 水剤

- ① 小児の場合：1回量が出来るかぎり少なくなる投薬瓶を選択する。
しかし、目盛りの判読し難い場合は、判別可能な目盛りを使用する。
各投薬瓶の使用可能な目盛りは、下表の通りとする。

30mL	: 4日の目盛り
60mL	: 5日の目盛り
100mL	: 7日の目盛り
200mL	: 7日の目盛り

- ② 大人の場合：日数別に下表の投薬瓶を使用する。

1日分	: 100mL (3日の目盛り)
2日分	: 200mL (2日の目盛り)
3～4日分	: 300mL (4日の目盛り)
5～7日分	: 500mL (7日の目盛り)

例外：約束処方を通水は、1日100mLになるように調剤する。

- ③ 原液調剤

下記薬剤は原液のまま調剤して計量カップを添付して投薬する。

アルロイド G 内用液 5%	単シロップ(日興製薬)
アルファロール内用液 0.5 μ g/mL	デカドロンエリキシル 0.01%
イトリゾール内用液 1%	デパケンシロップ 5%
インクレミンシロップ 5%	フェノバルールエリキシル 0.4%
エルカルチンFF内溶液	ポンタールシロップ 3.25%
カナマイシンシロップ 5%「明治」	マルファ配合内服液
D-ソルビトール内用液 75%「コーワ」	モニラック・シロップ 65%

6. 外用剤

原則1薬剤1薬袋とする。

軟膏薬が同一Rp. に複数処方されているときは、原則として混合調剤とする。

7. 問い合わせ

- ① 処方内容に関する問い合わせ
処方医
- ② 保険等に関する問い合わせ
各科事務
- ③ 調剤方法、後発品等への処方変更の連絡
薬剤科(FAX: 0567-66-1151)

8. 加筆による処方、原則禁止です。

★ 院内約束処方 ★

[2013年4月]

- 凡 例 -

1. 処方の分量は下記の通り
 ・内用薬 散 剤…1日量
 水 剤…1日量
 屯用剤…1回量
 ・外用薬はすべて製剤量
 2. 特別に記載のないものは
 容量mL、重量gにて

内 用 散 剤

T 散

タンニン酸アルブミン	2.0
アドソルビン	2.0
沈降炭酸カルシウム	2.0

(適:下痢) 分3

Gast

マーズレンS配合顆粒	2.0
アスコンプ顆粒	1.5
エクセラゼ配合顆粒	1.0

(適:胃粘膜保護、消化促進) 分3

PH散

メジコン散 10%	0.9
フスタゾール散 10%	0.6
タベジール散 0.1%	2.0
マーズレンS配合顆粒	1.2
エクセラゼ配合顆粒	1.0

(適:感冒…鼻水・咳) 分3

小 児 用 内 用 剤

PC

ペリアクチン散 1%	0.020
アスベリン散 10%	0.025
乳 糖	0.005
使用量 0.05 g/kg	

(適:小児用の感冒) 分3

Syr.H

アスベリンシロップ ^o 0.5%	7.0
アリメジンシロップ ^o 0.05%	9.0
精製水	ad 20.0
使用量 1 mL/kg	

(適:小児の感冒、鼻水・咳) 分3

内 用 水 剤咳 水 *M.Hust*

プロチンシロップ3.3%	5.0
キョウニン水	3.0
精製水	ad 100.0

(適:咳) 分3

プロチンシロップ供給不能のため院外不可通 水 *M.Abfuhl*

硫酸マグネシウム	15.0
苦味チンキ	2.0
精製水	ad 100.0

(適:緩下剤) 分3



外用水剤

二重水(2%重曹水)

炭酸水素ナトリウム	10g
精製水	適量

全量 500mL

(適:うがい、掻痒感軽減)

汗水

塩化アルミニウム	3g
70% アルコール	適量

全量 30mL

(適:多汗症) **院外不可**

点耳剤

耳水 *Ceruminal Wasser*

炭酸水素ナトリウム	5.0
グリセリン	25.0
精製水	ad 100.0

(適:耳あか栓塞の軟化)

軟膏剤

0.05% ZP

メチルバイオレット	0.25
亜鉛華軟膏	500.0

(適:皮膚患部の殺菌と乾燥(おむつかぶれ))

院外不可

ワセテラ軟膏

白色ワセリン	10.0
テラジアパスタ	10.0

全量 20.0

(適:緑膿菌感染褥創、重症感染症、熱傷)

ロコイドH軟膏

ロコイド軟膏	50.0
ハイドロキノン	2.5
亜硫酸水素ナトリウム	1.5

全量 54.0

(適:肝斑症) **院外不可**

別紙 2

ODP不可薬

MSコンチン錠10mg	タルセバ錠25mg	ソセゴン錠25mg
MSコンチン錠30mg	ティーエスワン 配合カプセル20mg	タケプロンOD錠15mg
MSコンチン錠60mg	ティーエスワン 配合カプセル25mg	タケプロンOD錠30mg
オキシコンチン錠10mg	テモダールカプセル100mg	デノタスチュアブル 配合錠
オキシコンチン錠20mg	テモダールカプセル20mg	トラマールカプセル25mg
オキシコンチン錠40mg	ネクサバール錠200mg	トラマールカプセル50mg
オキシコンチン錠5mg	ノルバデックス錠20mg	ニトロール錠5mg
コデインリン 酸塩錠20mg	ハイドレアカプセル500mg	ニトロペン舌下錠0.3mg
モルヒネ塩酸塩錠10mg「DSP」	ヒスロンH錠200mg	ネオール25mg
5-FU錠100協和	フェマール錠2.5mg	ネオール50mg
アフィニール錠5mg	フルダラ錠10mg	ビジクリア 配合錠
アムノレイク錠2mg	プロセキソール錠0.5mg	フォサマック錠35mg
アリミデックス錠1mg	ユーエフティ 配合カプセルT100	プラザキサカプセル110mg
イレッサ錠250mg	レブラミドカプセル5mg	プラザキサカプセル75mg
インライタ錠1mg	アボルブカプセル0.5mg	プラノバル 配合錠
インライタ錠5mg	アリセプトD錠10mg	フリバスOD錠75mg
エストラサイトカプセル156.7mg	アリセプトD錠3mg	プロレナール錠5μg
エンドキサン錠50mg	アリセプトD錠5mg	ベネット錠17.5mg
オダイン錠125mg	イメンドカプセル80mg	ペルマックス錠250μg
カソデックス錠80mg	イメンドカプセル125mg	ペルマックス錠50μg
グリベック錠100mg	エクジェイド懸濁用錠500mg	ポノテオ錠50mg
ザーコリカプセル200mg	エフピーOD錠2.5mg	ミラペックスLA錠0.375mg
ザーコリカプセル250mg	エルカルチン錠300mg	ミラペックスLA錠1.5mg
サレドカプセル100	オーグメンチン 配合錠125SS	ラジレス錠150mg
スーテントカプセル12.5mg	オラセフ錠250mg	リウマトレックスカプセル2mg
スチバーガ錠40mg	カバサール錠1.0mg	リパクレオンカプセル150mg
スプリセル錠20mg	キックリンカプセル250mg	ルナベル 配合錠
スプリセル錠50mg	クラリチンレディタブ錠10mg	レグパラ錠25mg
ゼローダ錠300mg	コンサータ錠18mg	レナデックス錠4mg
タイケルブ錠250mg	コンサータ錠27mg	レミッチカプセル2.5μg
タシグナカプセル150mg	ジプレキサザイデイス錠5mg	レルパックス錠20mg
タシグナカプセル200mg	ジレニアカプセル0.5mg	ロルカム錠4mg
タルセバ錠100mg	セレジストOD錠5mg	
タルセバ錠150mg	ゾーミグRM錠2.5mg	

